

INDIANA 2019–20

Required and Recommended School Immunizations



GRADE	REQUIRED		RECOMMENDED
Pre-K	• 3 Hepatitis B • 4 DTaP (Diphtheria, Tetanus & Pertussis) • 3 Polio	• 1 Varicella (Chickenpox) • 1 MMR (Measles, Mumps & Rubella)	• Annual influenza • 2 Hepatitis A
K–5th grade	• 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio	• 2 Varicella • 2 MMR • 2 Hepatitis A	• Annual influenza
6th–7th grade	• 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio • 2 Varicella	• 2 MMR • 2 Hepatitis A • 1 MCV4 (Meningococcal) • 1 Tdap (Tetanus, Diphtheria & Pertussis)	• Annual influenza • 2 HPV (Human papillomavirus)
8th–11th grade	• 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio • 2 Varicella	• 2 MMR • 1 MCV4 • 1 Tdap	• Annual influenza • 2 Hepatitis A • 2/3 HPV
12th grade	• 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio • 2 Varicella	• 2 MMR • 2 Hepatitis A • 2 MCV4 • 1 Tdap	• Annual influenza • 2 MenB (Meningococcal) • 2/3 HPV

Number next to vaccine denotes the number of cumulative doses needed.

Hep B: The minimum age for the 3rd dose of Hepatitis B is 24 weeks of age.

DTaP: 4 doses of DTaP/DTP/DT are acceptable if 4th dose was administered on or after child's 4th birthday.

Polio*: 3 doses of Polio are acceptable for all grade levels if the 3rd dose was given on or after the 4th birthday and at least 6 months after the previous dose.

*For students in grades K-9, the final dose must be administered on or after the 4th birthday and be administered at least 6 months after the previous dose.

Varicella: Physician documentation of disease history, including month and year, is proof of immunity for children entering preschool through 11th grade. Parental report of disease history is acceptable for grade 12.

Tdap: There is no minimum interval from the last Td dose.

MCV4: Individuals who receive dose 1 on or after the 16th birthday only need 1 dose of MCV4.

Hep A: The minimum interval between 1st and 2nd dose is 6 calendar months. 2 doses are required for grades K-7 and 12. For Pre-K and grades 8-11, 2 doses of Hep A are recommended.

Indiana State Department of Health, Immunization Division | (800) 701-0704



INDIANA 2019–20

Vacunas escolares requeridas y recomendadas



Grado	Requerida		Recomendada
3 a 5 años de edad	• 3 Hepatitis B • 4 DTaP (Difteria, tétanos y tos ferina) • 3 Polio	• 1 Varicela • 1 MMR (Sarampión, paperas y rubéola)	• Influenza anual • 2 Hepatitis A
Kinder a 5to. grado	• 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio	• 2 Varicela • 2 MMR • 2 Hepatitis A	• Influenza anual
6to. a 7mo. grado	• 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio • 2 Varicela	• 2 MMR • 2 Hepatitis A • 1 MCV4 (antimeningocócica) • 1 Tdap (Tétanos, difteria y tos ferina)	• Influenza anual • 2 HPV (Virus del papiloma humano)
8vo. a 11vo. grado	• 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio • 2 Varicela	• 2 MMR • 1 MCV4 • 1 Tdap	• Influenza anual • 2 Hepatitis A • 2/3 HPV
12vo. grado	• 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio • 2 Varicela	• 2 MMR • 2 Hepatitis A • 2 MCV4 • 1 Tdap	• Influenza anual • 2 MenB (antimeningocócica) • 2/3 HPV

El número junto a la vacuna indica la cantidad de dosis acumuladas necesarias.

Hep B: La edad mínima para la tercera dosis de Hepatitis B es de 24 semanas.

DTaP: 4 dosis de DTaP/DTP/DT son aceptables si la 4ta. dosis se aplicó el día en que el niño cumple 4 años de edad o después.

Polio*: 3 dosis de polio son aceptables para todos los grados si la tercera dosis se aplicó el día en que el niño cumple 4 años de edad o después y al menos 6 meses después de la dosis anterior.

*Para los alumnos en Kinder a 9vo. grado, la dosis final se debe aplicar el día en que el niño cumple 4 años de edad o después, y al menos 6 meses después de la dosis anterior.

Varicela: La documentación del médico sobre el historial de enfermedades, que incluya mes y año, es prueba de inmunidad para los niños que ingresan a preescolar y hasta el 11vo. grado. La información por parte de los padres sobre el historial de enfermedades es aceptable para 12vo. grado.

Tdap: No existe intervalo mínimo para la última dosis de Td.

MCV4: Las personas que reciben la primera dosis después de cumplir 16 años de edad solo necesitan una dosis de MCV4.

Hep A: El intervalo mínimo entre la primera y la segunda dosis es de 6 meses calendario. Se requieren 2 dosis de Hep A para Kinder a 7mo. grado y 12vo. grado. De 3 a 5 años de edad y los grados 8vo. A 11vo., se recomiendan dos dosis de vacuna contra Hep A.

División de Vacunas del Departamento de Salud del Estado de Indiana | (800) 701-0704

